

Blongios nain *Ixobrychus minutus*

L 33-38 cm E 50-58 cm. Fréquente les bordures des marais d'eau douce et les canaux. Très petit, discret et difficile à voir. Mâle : joues grises et cou avec des raies ocre. Femelle : dos et calotte bruns. Joues et cou de couleur rouille, gorge et poitrine marquées. Juvénile : terne avec un plumage écaillé, et une fine moustache. En vol, noter les couvertures claires. Très agile : grimpe dans les roseaux et la végétation. Le chant est un discret «ouho» difficilement audible de loin. Peuple toute l'Europe. Nid au milieu des roseaux ou dans un buisson. 5-6 œufs. Migrateur transsaharien, présent d'avril à septembre.

Butor étoilé *Botaurus stellaris*

L 70-80 cm E 100-135 cm. Difficile à voir posé, plus souvent observé en vol au dessus des vastes roselières où il niche. Taille moyenne, plumage marron chamois marqué de noir lui conférant un mimétisme parfait dans les roseaux. Chasse à l'affût en bordure de végétation. Dérangé, adopte une posture de camouflage, bec en l'air et cou tendu verticalement. Le mâle pousse au printemps un mugissement proche de la corne de brume audible à plusieurs centaines de mètre, qui permet d'estimer les populations nicheuses. Cri en vol «Ahô». Espèce faisant l'objet d'un plan national d'action pour sa conservation. Peuple toute l'Europe 4-6 œufs. Présent toute l'année. En hiver, arrivée d'oiseaux venant d'Europe centrale, tandis que certains individus migrent jusqu'en Afrique du nord.

Bihoreau gris (ou Héron bihoreau) *Nycticorax nycticorax*

L 58-65 cm E 90-112 cm. Présent sur les marais d'eau douce ou le long des canaux. Héron de taille moyenne, ramassé. Calotte et dos bleu foncé paraissent noirs, deux aigrettes blanches, gros yeux rouges, pattes orange et un bec noir « banané ». Principalement crépusculaire et nocturne. Le soir, s'envole depuis son perchoir diurne (arbres) en poussant un «mOUac» caractéristique. Chasse poissons, batraciens et insectes aquatiques à l'affût. Occupe la moitié sud de l'Europe. Niche dans les arbres, au dessus de l'eau, en colonie mixte. 3-5 œufs. Hiverné en Afrique. Présent de mars à octobre (quelques individus hivernent).

Héron gardebœufs *Bubulcus ibis*

L 48-53 cm E 80-92 cm. Souvent perché sur le dos des grands mammifères. Taille moyenne. Blanc, marqué d'orange sur la tête et le dos en période de reproduction. Bec orange assez court, devenant rouge pendant la reproduction et pattes verdâtres, orange au printemps, brunâtres chez les jeunes. Se nourrit d'insectes et d'amphibiens. Oiseau africain ayant colonisé la Camargue puis la France de manière spectaculaire. Première observation en 1953, puis deux couples se reproduisent en 1969. Ils sont aujourd'hui plusieurs milliers. Niche dans les arbres en compagnie d'autres espèces. 3-5 œufs. Présent toute l'année.

Héron crabier (ou Crabier chevelu) *Ardeola ralloides*

L 40-49 cm E 71-92 cm. Souvent observé dans les marais d'eau douce. Superbe oiseau, de moindre taille que l'Aigrette garzette, d'une couleur ocre jaune caractéristique sur le dos. Tête coiffée d'une « chevelure » de longues plumes jaunes liserées de noir descendant sur la nuque. Bec bleu, noir à la pointe. Occupe le sud de l'Europe. Espèce menacée, la Camargue constituant un des bastions de l'espèce. Niche discrètement au sein des colonies d'autres hérons arboricoles. 4-6 œufs. Migrateur transsaharien. Présent d'avril à septembre.

Blongios nain

femelle



petit. dos et tête noirs, ventre ocre, yeux et bec jaune

mâle



Butor étoilé



marron strié de noir



Bihoreau gris



juvénile



gros yeux rouges, bec noir et banané calotte et dos bleu nuit

Héron gardeboeufs



plumage hivernal

très souvent en compagnie des troupeaux




plumage nuptial

blanc avec un bec orange

Héron crabier

bec bleu avec une pointe noire

dos et cou ocre, longues plumes jaunes et noires sur la nuque



ailles toutes blanches